

# Wisselteelt



	<i>Bemestingsbehoefte</i>		
<i>Planten-families</i>	<i>Veel bemesting</i>	<i>Matige bemesting</i>	<i>Weinig bemesting</i>
Komposieten		BLADGEWASSEN Sla, andijvie, groenlof, kardoen	WORTELGEWASSEN witlof, schorseneer
Valeriaan		Veldsla	
Postelein		Winterpostelein	
Ijskruid		Nieuw-Zeelandse spinazie, ijskruid	
Ganzevoet		Spinazie, tuinmelde, snijbiet	Rode biet
Look	prei		Ajuin, sjalot, knoflook
Schermbloemen		Selderij, peterselie, kervel	Wortel, pastinaak, knolvenkel

Kruisbloemen		Tuinkers	
	KOOLGEWASSEN, Sluitkool, boerenkool, Chinese kool, bloemkool, broccoli	Spruitkool, koolraap, raap, koolrabi, raapstelen	Radijs, rammenas, rucola
Grassen	VRUCHTGEWASSEN suikermaïs		
Komkommer	Pompoen, courgette, augurk, komkommer, meloen		
Nachtschade	Tomaat. Aubergine, paprika, peper		
	AARDAPPELEN		
Rozen		AARDBEI	
Vlinderbloemen			PEULVRUCHTEN Erwt, boon, sojaboon, tuinboon

## Wisselteelt

Dit betekent dat een gewas elk jaar op een ander bedje staat, het schuift steeds door. Om:

- Belagers te verwarren (zoals preivlieg, phytophthora)
- Bemesting te benutten (de groentes met matige en kleine bemestingsbehoefte komen na die met grote bemestingsbehoefte)
- Bodemstructuur af te wisselen (wortelgewassen maken de bodem goed los)
- Onkruidbestrijding (met name bij de aardappels heb je daarna weinig onkruid)

Denk ook aan:

Welke groentes wil je eigenlijk zetten, wat vind je lekker

Bladgewassen kun je in combinatie- en voor-nateelt extra zetten met 2-3 jaar wissel

Tomaten hebben beschutting nodig (kas, plastic dakje) op enkele uitzondering na

Kool en aardappelen hebben echt teeltwisseling nodig van 5 jaar (kool liever nog 7)

## Voor- en nateelt (voor optimale benutting van de grond)

de hoofdteelt krijgt volledig de aangeraden bemesting

de voorteelt heeft meestal weinig nodig en krijgt geen extra bemesting

de nateelt krijgt wanneer deze na een hoofdteelt komt, de halve aangeraden bemesting

de nateelt krijgt wanneer deze na een voorteelt komt, de volledig aangeraden bemesting, omdat deze dan langer op het land staat

Hoofdteelten zonder voor-of nateelt	Hoofdteelt	Met bijvoorbeeld als nateelt	Hoofdteelt	Met bijvoorbeeld als voorteelt
winterwortel zaaiui witlof knolselder pastinaak schorseneer rode biet late aardappel	zomerprei ijsbergsla vroeg bloemkool vroeg wortel plantui vroeg aardappel erwt tuinboon	winterprei kropsla veldsla andijvie groenlof spinazie winterpostelein bleekselder boerenkool koolraap knolvenkel	bleekselder groene selder rode, witte kool spruit/bloemkool broccoli pompoen tomaat suikermaïs courgette komkommer boon	kropsla snijsla spinazie snijbiet tuinkers kervel radijs koolrabi spitskool raapstelen rode biet

## Verschillende teelten

De bodem in de moestuin wordt intensief gebruikt, daarom is het belangrijk zorgvuldig om te gaan met teeltwisseling. Voor een optimale opbrengst zet je voor- en nateelten.

Om een betere smaak, gezondere groei of minder ziekte en ongedierte te krijgen, pas je combinatieteelt toe.

Maar het uitgangspunt zijn de hoofdteelten in de wisselteelt.